



سی‌تی‌اسکن مغز بدون کنتراست در آقای میانسالی که با شکایت از به زمین افتادن‌های مکرر از ۲ هفته پیش به بخش اورژانس مراجعه کرده‌است

شرح‌حالی از تصادف موتور با ماشین را، که ۳ هفته قبل افتاده است، ذکر می‌کند



The Spiral Brain CT scan shows Subacute Subdural Hematoma on both sides

در هماتوم ساب دورال تحت حاد با گذشت زمانی حدود ۳ تا ۲۱ روز دانسیته خون کاهش می یابد
و بصورت ایزودنس با بافت مغز کنارش در می آید

در این حالت تشخیص هماتوم ساب دورال مشکل خواهد شد، بویژه زمانی که بصورت دوطرفه
اتفاق بیافتد

می توان ام آر آی یا سی تی اسکن مغز با کنتراست برای تشخیص کمک گرفت

برای تشخیص هماتوم ساب دورال مزمن در این شرایط می توان از نشانه های زیر کمک گرفت:

- عدم ادامه یافتن سولکوس های مغزی تا کنار استخوان جمجمه
- اثر فشاری و وجود شیفت میدلاین (جابجا شدن ساختارهای خط وسط مغزی به سمت مقابل)
- به نظر رسیدن افزایش ضخامت در کورتکس مغز